

LES PONCTIONS MÉDULLAIRES ET LOMBAIRES

Cher patient,

Bienvenue au Service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique des Cliniques universitaires Saint-Luc.

Votre enfant va bientôt bénéficier d'une ponction médullaire ou d'une ponction lombaire.

Cette brochure vous donne de plus amples informations sur cette intervention et sur votre préparation à cette procédure.

Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser au médecin ou à l'infirmière.

Votre rendez-vous *(à compléter par vos soins)*

Date :

Heure :

Lieu :

INFORMATIONS

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
SERVICE D'HÉMATOLOGIE
ET D'ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

SECRÉTARIAT : +32 2 764 23 50




Qu'est-ce qu'une ponction médullaire ou lombaire ?

La ponction de moelle osseuse ou médullaire (PM)


La ponction de moelle est une procédure qui permet d'aller puiser avec une grosse aiguille un peu de moelle à l'intérieur de l'os du bassin.

La PM permet de détecter et d'identifier les anomalies au niveau de la moelle, où se trouvent les cellules productrices du sang.



La ponction lombaire (PL)

La ponction lombaire est une procédure médicale consistant à recueillir quelques gouttes de liquide céphalo-rachidien (LCR) en introduisant une très fine aiguille entre deux vertèbres lombaires du bas du dos. L'analyse du LCR permet de repérer si des anomalies sont présentes au niveau du système nerveux central.



Parfois, le pédiatre injecte de la chimiothérapie localement afin d'éliminer toutes cellules cancéreuses qui pourraient se trouver dans cet espace inaccessible par les traitements intra veineux.

Comment vous y préparer ?

Le pédiatre vous explique pourquoi votre enfant a besoin d'une PM, d'une PL ou des deux.

Votre enfant sera légèrement endormi (sédation), il doit donc être à jeun 6 heures avant l'heure de votre rendez-vous.

Pour les bébés nourris exclusivement de lait maternel vous pouvez en parler avec le médecin.

La procédure

Les ponctions sont réalisées dans une salle du quartier opératoire.

Les PM et PL sont toujours effectuées par un médecin, aidé d'une infirmière.

Vous pourrez accompagner votre enfant jusqu'à ce que l'anesthésiste l'endorme.

Vous devrez mettre une blouse, un masque, une coiffe et des sur-chaussures.

Pour faciliter la procédure, votre enfant sera couché sur le côté.

Que se passe-t-il après la procédure ?

Vous pouvez rejoindre votre enfant dans la salle de réveil. Une fois réveillé, s'il n'a pas de douleurs ni de vomissements vous revenez avec lui dans la chambre d'hospitalisation. Il peut alors se réalimenter dès qu'il le désire.

Si votre enfant a bénéficié d'une PL avec injection de chimiothérapie, il est conseillé de rester couché minimum 2 heures pour éviter les maux de têtes et les nausées dues à la modification de pression dans le LCR.

Les résultats des ponctions vous seront communiqués avant votre retour à la maison.

Le retour à la maison

Les pansements doivent rester secs et propres pendant deux jours puis peuvent être enlevés et la peau peut rester à l'air.

Si votre enfant a bénéficié d'une PM, le site du prélèvement peut être légèrement douloureux. N'hésitez pas à y appliquer des poches de glace et donner du paracétamol à votre enfant.

Suite à une PL ou une PM, si des symptômes tels que céphalées, fortes douleurs, rougeurs, gonflement, fièvre ou écoulement apparaissent,appelez le service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique.

En cas de questions ou d'inquiétudes, n'hésitez pas à contacter le service.